



RECOMENDACIONES AEER PARA LA SEGURIDAD EN LA REALIZACION DE LA BRONCOSCOPIA ANTE LA INFECCION POR COVID 19

La infección por el COVID 19 se transmite principalmente por gotas respiratorias, nebulizaciones o aerosoles, además del contacto directo. La vía aérea es la principal fuente de contagio para el personal de Broncoscopias y exige una serie de medidas protectoras en los casos confirmados o sospechosos de infección por COVID 19 que se resumen en este documento de expertos.

1. La broncoscopia no es el método diagnóstico de rutina para el muestreo de la infección por COVID 19
2. En los casos sospechosos de infección por COVID 19 se recomienda realizar el test diagnóstico previo a la realización de la broncoscopia
3. A todos los pacientes se les debe poner una mascarilla quirúrgica para evitar la emisión de gotas con la tos durante y después del procedimiento broncoscópico.
4. En la sala de Broncoscopia debe permanecer el personal imprescindible para el procedimiento manteniendo la máxima distancia posible con el paciente.
5. El personal debe utilizar pijamas desechables evitando la ropa habitual o batas de tela
6. El personal debe protegerse utilizando mascarilla con nivel FFP2 ó mejor FFP3
7. El personal debe utilizar bata impermeable de un solo uso.
8. El personal debe utilizar gafas protectoras cerradas tipo “buceo” no siendo eficaces las gafas abiertas lateralmente “anti-salpicaduras”
9. El personal debe utilizar guantes desechables.
10. Las muestras deben manejarse con cuidado extremo evitando manipulaciones innecesarias.



11. Las superficies, electrodos, camilla, etc. deben limpiarse con toallitas desinfectantes después de cada procedimiento.
12. Se recomienda utilizar broncoscopios desechables de un solo uso para los casos conocidos o altamente probables debido al riesgo de contaminación del personal que los reprocessa.
13. Se recomienda que la sala de broncoscopia disponga de un sistema de ciclado del aire de la sala a una frecuencia de 12-15 veces a la hora y manteniendo presión negativa. En caso de no disponerse hay que ventilar la sala durante 10 minutos.

5 de marzo de 2020